

Kapitola 4

Fuzzy množiny a fuzzy relace

Ústředním pojmem tohoto kurzu je fuzzy množina. Fuzzy množiny slouží k modelování souborů objektů, u nichž je nejlepší odpovědí na otázku, zda objekt do souboru patří, pravdivostní stupeň vybraný z vhodné uspořádané škály. Fuzzy množina A je tedy určena třemi údaji: universem X objektů, kterých se otázka týká, škálou L pravdivostních stupňů a pravidlem, které objektům přiřazuje pravdivostní stupně.

Za škálu pravdivostních stupňů budeme brát residuovaný svaz z předchozích kapitol.

Definice 4.1

Nechť L je residuovaný svaz a X je neprázdná množina. **L-množina** v X je zobrazení $A : X \rightarrow L$.

Fuzzy množina je tedy zobrazení z universa do škály pravdivostních stupňů. Terminologie a značení, které teď zavedeme, jsou ovšem množinové: hodnotu $A(x)$ čteme jako odpověď na otázku, do jaké míry prvek x do A patří.

Terminologie. Místo označení **L-množina** se také často používá pojem **fuzzy množina** nebo **L-fuzzy množina**. Hodnota $A(x)$ pak představuje **stupeň příslušnosti prvku x do množiny A** . Pojem fuzzy množiny zavedl L. A. Zadeh [ZADEH65]; obecnější L-množiny s hodnotami v úplném svazu uvažoval J. A. Goguen [GOGUEN67].

Množinu všech L-množin v X budeme označovat L^X . L-množina A bude též značena zápisem $\{A(x)/x \mid x \in X\}$. Pokud navíc pro

Stupeň příslušnosti x do A se v literatuře původně značil $f_A(x)$, později $\mu_A(x)$; dnes se píše prostě $A(x)$.

[ZADEH65]
L. A. Zadeh:
Fuzzy sets.
Information and Control 8(3), 338–353
(1965).

[GOGUEN67]
J. A. Goguen:
L-fuzzy sets.
Journal of Mathematical Analysis and
Applications 18(1), 145–174 (1967).

všechny prvky y odlišné od $x_1, x_2, \dots, x_n$ platí $A(y) = 0$, píšeme zkráceně

$$A = \{A(x_1)/x_1, A(x_2)/x_2, \dots, A(x_n)/x_n\}.$$

L-množina A se nazývá **singleton**, pokud existuje právě jedno $x \in X$, pro které $A(x) > 0$. Dále říkáme, že L-množina A je **dvouhodnotová** (též **bivalentní**), pokud pro všechna $x \in X$ platí $A(x) \in \{0, 1\}$. Nakonec, **výška** L-množiny A je definována vztahem

$$\text{hgt}(A) = \bigvee_{x \in X} A(x).$$

Obvykle nerozlišujeme podmnožiny X a $\{0, 1\}$ -hodnotové L-množiny v X .



Lotfi A. Zadeh

Lotfi A. Zadeh (1921–2017)

Narodil se v Baku v rodině ázerbájdžánského novináře a ruské dětské lékařky; když mu bylo deset, přestěhovala se rodina do Teheránu. Po studiu elektrotechniky na Teheránské univerzitě odešel roku 1944 do Spojených států – magisterský titul získal na MIT, doktorát na Kolumbijské univerzitě a od roku 1959 působil na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde katedru elektrotechniky později i vedl a stál u jejího rozšíření o informatiku (dnešní EECS).

Dříve než se začal věnovat fuzzy logice, byl Zadeh známým odborníkem v teorii systémů: je spoluautorem z-transformace, základního nástroje číslicového zpracování signálů, a jedním z průkopníků stavového popisu systémů. Článek *Fuzzy sets* [ZADEH65] napsal až ve svých čtyřiačtyřiceti letech. Přes počáteční posměch (vzpomeňme okrajové poznámky v kapitole 1) se stal jedním z nejcitovanějších vědeckých textů všech dob – dnes má přes sto tisíc citací. Zadeh na něj navázal lingvistickými proměnnými a přibližným usuzováním (1973–1975, viz kapitola 12) a teorií možnosti (1978).

Z mnoha poct jmenujme alespoň IEEE Medal of Honor (1995) a Franklinovu medaili (2009). Vědecky pracoval do vysokého věku; zemřel v Berkeley v roce 2017, v šestadevadesáti letech.

Příklad 4.1

Nechť $X = \{\text{kružnice, čtverec, hexagon}\}$ a L je standardní Gödelova algebra na $[0, 1]$. Uvažujme množinu $A : X \rightarrow [0, 1]$ danou předpisem

$$A(\text{kružnice}) = 1, \quad A(\text{čtverec}) = 0, \quad A(\text{hexagon}) = 0.5.$$


Intuitivně jde o množinu kružnicovitých tvarů.

Příklad 4.2

X – množina všech reálných čísel, L je Łukasiewiczova algebra na $[0, 1]$. Definujme L -množinu $A \in L^X$ takto


$$A(x) = \begin{cases} x - 4 & \text{pro } 4 \leq x \leq 5, \\ 6 - x & \text{pro } 5 < x \leq 6, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Pak A reprezentuje pojem „zhruba 5“:




Příklad 4.3

$X = [100, 250]$ je rozsah výšky lidí v cm, $L = [0, 1]$.
Následující obrázky ukazují fuzzy množiny S , M a T představující významy slov „malý“, „střední“ a „vysoký“.



Příklad 4.4

$X = [100, 250]$ je rozsah výšky lidí v cm, $L = [0, 1]$.
Následující obrázky ukazují fuzzy množiny RT , T a VT představující významy slov „spíše vysoký“, „vysoký“ a „velmi vysoký“.



Nabízejí se dvě přirozené otázky: *kde se berou stupně příslušnosti?* a *do jaké míry záleží na přesném stupni příslušnosti?*

První otázka má ve skutečnosti dvě části. Zaprvé: jaké jsou stupně příslušnosti, jaká je jejich povaha a význam? To je otázka svou povahou filozofická a epistemologická a v tomto kurzu se na ni nepokoušíme odpovědět; předpokládáme, že intuitivní chápání pojmu částečného stupně pravdy je jasné a přijatelné. Zadruhé: jak stupně příslušnosti konkrétně určit? To je v podstatě otázka odborných znalostí (stupně příslušnosti nám sdělí expert), nebo návrhu experimentu (stupně příslušnosti se extrahují z dat) – podíváme se na to později.

Druhá otázka – do jaké míry záleží na přesných hodnotách stupňů příslušnosti – je matematicky dobře uchopitelná a pro tento kurz důležitější. Při odpovědi využijeme stupňovanou inkluzi a rovnost fuzzy množin, které zavedeme ještě v této kapitole. Uvidíme, že fuzzy množiny se v tomto ohledu chovají přirozeně.

4.1 L-relace

Podobně jako v klasické teorii množin, kde relace není nic jiného než množina uspořádaných n -tic, zavedeme fuzzy relace jako fuzzy množiny na kartézském součinu. Hodnota $R(x_1, \dots, x_n)$ pak vyjadřuje stupeň, v němž jsou prvky $x_1, \dots, x_n$ v relaci R .

Definice 4.2

Pokud $X = X_1 \times \dots \times X_n$, pak **L-množina** na X se nazývá (n -ární) **L-relace** mezi $X_1, X_2, \dots$ a X_n .

Pokud $X_1 = \dots = X_n$, mluvíme o n -ární **L-relaci** na množině X_1 .

Příklad 4.5

Nechť $X = \mathbf{R}$ a $\mathbf{L}$ je libovolný RS s $L = [0, 1]$.
Definujeme $E : X \times X \rightarrow [0, 1]$ takto:

$$E(x, y) = \max(0, 1 - |x - y|).$$

Pak E je binární $\mathbf{L}$ -relace na X .

Intuitivně: E reprezentuje relaci „být blízko sebe“.

4.2 Operace s $\mathbf{L}$ -množinami

Množinu L^X můžeme chápat jako přímý součin $|X|$ kopií množiny L . Proto může být přirozeně vybavena operacemi odvozenými z $\mathbf{L}$.

Libovolnou n -ární operaci $f : L^n \rightarrow L$ rozšíříme na n -ární operaci $\bar{f} : (L^X)^n \rightarrow L^X$ předpisem

$$\bar{f}(A_1, \dots, A_n)(x) = f(A_1(x), \dots, A_n(x)),$$

tedy po složkách (bodově).

Stejným způsobem jsou v L^X definována i libovolná infima a suprema.

Konkrétně operace $\wedge, \vee, \otimes, \rightarrow, 0, 1$, a také $\bigvee$ a $\bigwedge$, definované na L , rozšíříme po složkách na operace $\wedge^{L^X}, \vee^{L^X}, \otimes^{L^X}, \rightarrow^{L^X}, 0^{L^X}, 1^{L^X}, \bigvee^{L^X}$ a $\bigwedge^{L^X}$ na L^X .

V dalším však budeme používat obvyklou množinovou notaci: $\cap, \cup, \otimes, \rightarrow, \emptyset, X, \bigcap$ a $\bigcup$.

Máme tedy:

$$(A \cap B)(x) = A(x) \wedge B(x)$$

$$(A \cup B)(x) = A(x) \vee B(x)$$

$$(A \otimes B)(x) = A(x) \otimes B(x)$$

$$(A \rightarrow B)(x) = A(x) \rightarrow B(x)$$

$$\emptyset(x) = 0$$

$$X(x) = 1$$

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)(x) = \bigwedge_{i \in I} A_i(x)$$

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)(x) = \bigvee_{i \in I} A_i(x)$$

$$A \subseteq B \quad A(x) \leq B(x) \text{ pro všechna } x \in X$$

pro všechna $A, B, A_i \in L^X$ ($i \in I$) a $x \in X$.

Věta 4.6

Pro libovolný RS L a množinu $X \neq \emptyset$ je

$$L^X = \langle L^X, \cap, \cup, \otimes, \rightarrow, \emptyset, X \rangle$$

RS, kde infima a suprema jsou $\cap$ a $\cup$, a svazové uspořádání je $\subseteq$.


Navíc všechny rovnosti a nerovnosti platné v L budou po zobecnění platit i v L^X .

Tato věta zobecňuje dobře známý fakt, že množina všech podmnožin dané množiny tvoří úplnou Booleovu algebra – ten dostaneme volbou dvouprvkové Booleovy algebry 2 za L .


Vše, co jsme v kapitole 2 dokázali o residuovaných svazech, platí tedy i pro fuzzy množiny – každá nerovnost mezi pravdivostními stupni dává odpovídající vztah mezi fuzzy množinami. Dále toho budeme využívat bez zvláštního upozornění.

Příklad 4.7

Nechť L je standardní Łukasiewiczova algebra na $[0, 1]$:



Následující obrázek ukazuje výsledky operací $\cap, \cup, \otimes, \neg$.



Průnik a sjednocení lze definovat i pro systém množin, který je sám fuzzy, tj. každá množina do něj patří jen v jistém stupni. Rozmyslete si, že pro bivalentní $\mathcal{M}$ dávají následující předpisy obvyklý průnik a sjednocení.

Definice 4.3

Nechť $\mathcal{M}$ je $\mathbf{L}$ -množina v Y a každý $y \in Y$ je $\mathbf{L}$ -množina v X .

Tj. $\mathcal{M} \in L^{L^X}$.

Definujeme $\mathbf{L}$ -množiny $\bigcap \mathcal{M}$ a $\bigcup \mathcal{M}$:

$$(\bigcap \mathcal{M})(x) = \bigwedge_{A \in Y} \mathcal{M}(A) \rightarrow A(x),$$

$$(\bigcup \mathcal{M})(x) = \bigvee_{A \in Y} \mathcal{M}(A) \otimes A(x).$$

Zjevně $\bigcap \mathcal{M}$ a $\bigcup \mathcal{M}$ jsou zobecněním průniku a sjednocení systému množin.

4.3 Podmnožinovitost ve stupních

Relace $\subseteq$ na L^X je bivalentní – libovolné $\mathbf{L}$ -množiny buďto splňují $A \subseteq B$, nebo ne.

Z pohledu pravdivosti ve stupních je přirozené uvažovat podmnožinovitost ve stupních:

Pro klasické množiny:

$$A \subseteq B \quad \text{právě když} \quad \forall x \in X: x \in A \text{ implikuje } x \in B.$$

Přímé zobecnění nám dá:

$$S(A, B) = \bigwedge_{x \in X} (A(x) \rightarrow B(x))$$

Příklad 4.8

Pro Łukasiewiczovu, Gödelovu a součinnovou strukturu na $[0, 1]$ máme:

(Łukasiewicz)

$$S(A, B) = \bigwedge \{1 - A(x) + B(x) \mid x \in X, A(x) > B(x)\}$$

(Gödel)

$$S(A, B) = \bigwedge \{B(x) \mid x \in X, A(x) > B(x)\}$$

Na relaci $S(A, B)$ se můžeme podívat i z jiného úhlu pohledu. Uvažujme $\mathbf{L}$ -množinu $A \rightarrow B$, kterou lze chápat jako soubor pravdivostních hodnot $(A \rightarrow B)(x)$. Tyto hodnoty poskytují informaci o „podmnožinovitosti“ jednotlivých prvků. Tento soubor můžeme interpretovat jako pravdivostní hodnotu, protože L^X tvoří relační strukturu, jejíž prvky lze chápat právě jako pravdivostní hodnoty. Aby však nedocházelo k neúměrnému růstu dimenze struktury pravdivostních hodnot, agregujeme tyto hodnoty přirozeným způsobem – pomocí infima.

(součin)

$$S(A, B) = \bigwedge \{B(x)/A(x) \mid x \in X, A(x) > B(x)\}$$

Věta 4.9: Vlastnosti podmnožinovitosti ve stupních

$$S(A, A) = 1$$

$$S(A, B) \otimes S(B, C) \leq S(A, C)$$

$$S(A, B) = 1 \text{ právě když } A \subseteq B$$

$$S(\emptyset, A) = 1 \quad S(A, X) = 1$$

$$S(A, \bigcap_{i \in I} B_i) = \bigwedge_{i \in I} S(A, B_i)$$

$$S(\bigcup_{i \in I} A_i, B) = \bigwedge_{i \in I} S(A_i, B)$$

$$S(A, A \cap B) = S(A, B) = S(A \cup B, B)$$

$$S(A, B) \leq S(\neg B, \neg A)$$

pokud L splňuje zákon dvojí negace, pak

$$S(A, B) = S(\neg B, \neg A).$$

Důkaz

Obecně budeme používat fakt, že

$$a_x \leq b_x \quad (a_x, b_x \in L, x \in X) \text{ implikuje } \bigwedge_{x \in X} a_x \leq \bigwedge_{x \in X} b_x.$$

Důkaz k $S(A, A) = 1$:

$$S(A, A) = \bigwedge_{x \in X} (A \rightarrow A)(x) = \bigwedge_{x \in X} 1 = 1.$$

Důkaz k $S(A, B) \otimes S(B, C) \leq S(A, C)$:

$$\begin{aligned} S(A, B) \otimes S(B, C) &= \left(\bigwedge_{x \in X} A(x) \rightarrow B(x) \right) \otimes \left(\bigwedge_{y \in X} B(y) \rightarrow C(y) \right) \\ &\leq \bigwedge_{x \in X} \bigwedge_{y \in X} (A(x) \rightarrow B(x)) \otimes (B(y) \rightarrow C(y)) \\ &\leq \bigwedge_{x \in X} (A(x) \rightarrow B(x)) \otimes (B(x) \rightarrow C(x)) \\ &\leq \bigwedge_{x \in X} A(x) \rightarrow C(x) = S(A, C). \end{aligned}$$

Dále $S(A, B) = 1$, právě když $A(x) \rightarrow B(x) = 1$ pro všechna $x \in X$, tj. právě když $A(x) \leq B(x)$ pro všechna $x \in X$, tj. právě když $A \subseteq B$.

Rovnosti $S(\emptyset, A) = 1$ a $S(A, X) = 1$ jsou pak přímým důsledkem předchozího.

$$\begin{aligned} S(A, \bigcap_{i \in I} B_i) &= \bigwedge_{x \in X} A(x) \rightarrow \bigwedge_{i \in I} B_i(x) \\ &= \bigwedge_{x \in X} \bigwedge_{i \in I} (A(x) \rightarrow B_i(x)) \\ &= \bigwedge_{i \in I} \bigwedge_{x \in X} (A(x) \rightarrow B_i(x)) = \bigwedge_{i \in I} S(A, B_i) \end{aligned}$$

$$S(A, A \cap B) = S(A, A) \wedge S(A, B) = 1 \wedge S(A, B) = S(A, B)$$

Máme $A \rightarrow B \subseteq \neg B \rightarrow \neg A$, takže

$$S(A, B) = \bigwedge_{x \in X} (A \rightarrow B)(x) \leq \bigwedge_{x \in X} (\neg B \rightarrow \neg A)(x) = S(\neg B, \neg A).$$

Splňuje-li **L** zákon dvojí negace, platí dokonce rovnost $a \rightarrow b = \neg b \rightarrow \neg a$ (kapitola 3), tedy $A \rightarrow B = \neg B \rightarrow \neg A$ a obě infima se shodují, tj. $S(A, B) = S(\neg B, \neg A)$.

Stupňovaná inkluze se tedy chová jako inkluze klasická: je reflexivní, tranzitivní (ve fuzzy smyslu) a stejným způsobem souvisí s průniky, sjednoceními a doplňky. Třetí vlastnost navíc říká, že klasická inkluze je speciálním případem S : $S(A, B) = 1$, právě když $A \subseteq B$.

Ze stejných důvodů můžeme uvažovat rovnost **L**-množin ve stupních:

Definice 4.4

Pro $A, B \in L^X$ definujeme **stupeň rovnosti** A a B :

$$\approx(A, B) = \bigwedge_{x \in X} (A(x) \leftrightarrow B(x)).$$

Relaci $\approx$ chápeme jako binární **L**-relaci na množině L^X . Pro přehlednost budeme používat infixovou notaci, tedy zapisovat $(A \approx B)$. Tento výraz intuitivně představuje pravdivostní hodnotu tvrzení:

„ A a B obsahují stejné prvky.“

Ostrou rovnost = lze pak definovat pomocí relace $\approx$, neboť platí

$$\approx (A, B) = 1 \text{ právě tehdy, když } A = B.$$

Příklad 4.10

V případě Łukasiewiczovy, Gödelovy a součinnové struktury na $[0, 1]$ máme

$$A \approx B = \bigwedge_{x \in X} 1 - |A(x) - B(x)| \quad (\text{Łukasiewicz})$$

$$A \approx B = \bigwedge_{x \in X, A(x) \neq B(x)} \min(A(x), B(x)) \quad (\text{Gödel})$$

$$A \approx B = \bigwedge_{x \in X} \min\left(\frac{A(x)}{B(x)}, \frac{B(x)}{A(x)}\right) \quad (\text{součin})$$

kde bereme $0/0 = 1$ a $a/0 = \infty$ pro $a \neq 0$.

Věta 4.11

Nechť $A, B, C, D \in L^X$. Pak platí

$$A \approx A = 1 \quad (4.1)$$

$$A \approx B = B \approx A \quad (4.2)$$

$$(A \approx B) \otimes (B \approx C) \leq A \approx C \quad (4.3)$$

$$A \approx B = 1 \text{ právě když } A = B \quad (4.4)$$

$$A \approx B = S(A, B) \wedge S(B, A) \quad (4.5)$$

$$A \approx \emptyset = S(A, \emptyset) \quad (4.6)$$

$$A \approx X = S(X, A) \quad (4.7)$$

$$A \approx A \cap B = S(A, B) = A \cup B \approx B \quad (4.8)$$

$$(A \approx B) \otimes S(B, C) \otimes (C \approx D) \leq S(A, D) \quad (4.9)$$

$$A \approx B \leq \neg B \approx \neg A \quad (4.10)$$

$$\text{Pokud } L \text{ splňuje zákon dvojí negace, pak} \quad (4.11)$$

$$A \approx B = \neg B \approx \neg A. \quad (4.12)$$

Důkaz

$A \approx A = 1$ vyplývá z $A(x) \leftrightarrow A(x) = 1$.

$A \approx B = B \approx A$ vyplývá z $A(x) \leftrightarrow B(x) = B(x) \leftrightarrow A(x)$.

$$\begin{aligned}
& (A \approx B) \otimes (B \approx C) \\
&= \left(\bigwedge_{x \in X} (A(x) \leftrightarrow B(x)) \right) \otimes \left(\bigwedge_{y \in X} (B(y) \leftrightarrow C(y)) \right) \\
&\leq \bigwedge_{x \in X} \bigwedge_{y \in X} (A(x) \leftrightarrow B(x)) \otimes (B(y) \leftrightarrow C(y)) \\
&\leq \bigwedge_{x \in X} (A(x) \leftrightarrow B(x)) \otimes (B(x) \leftrightarrow C(x)) \\
&\leq \bigwedge_{x \in X} (A(x) \leftrightarrow C(x)) = A \approx C
\end{aligned}$$

$A \approx B = 1$ právě když $A(x) \leftrightarrow B(x) = 1$ pro všechna $x \in X$
 právě když $A(x) = B(x)$ pro všechna $x \in X$
 právě když $A = B$.

$$\begin{aligned}
A \approx B &= \bigwedge_{x \in X} (A(x) \leftrightarrow B(x)) \\
&= \bigwedge_{x \in X} ((A(x) \rightarrow B(x)) \wedge (B(x) \rightarrow A(x))) \\
&= \left(\bigwedge_{x \in X} (A(x) \rightarrow B(x)) \right) \wedge \left(\bigwedge_{x \in X} (B(x) \rightarrow A(x)) \right) \\
&= S(A, B) \wedge S(B, A)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
A \approx \emptyset &= S(A, \emptyset) \wedge S(\emptyset, A) = S(A, \emptyset) \wedge 1 = S(A, \emptyset) \\
A \approx X &= S(A, X) \wedge S(X, A) = 1 \wedge S(X, A) = S(X, A)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
A \approx A \cap B &= S(A, A \cap B) \wedge S(A \cap B, A) \\
&= S(A, B) \wedge 1 = S(A, B)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
A \cup B \approx B &= S(A \cup B, B) \wedge S(B, A \cup B) \\
&= S(A, B) \wedge 1 = S(A, B)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(A \approx B) \otimes S(B, C) \otimes (C \approx D) &\leq S(A, B) \otimes S(B, C) \otimes S(C, D) \\
&\leq S(A, D)
\end{aligned}$$

$$A \approx B \leq \neg B \approx \neg A$$

Pokud L splňuje zákon dvojí negace, pak

$$A \approx B = \neg B \approx \neg A.$$

Toto vyplývá z odpovídajících (ne)rovností pro $S(\cdot, \cdot)$.

Rovnost $A \approx B = S(A, B) \wedge S(B, A)$ je stupňovaná obdoba faktu, že množiny jsou si rovny, právě když je každá z nich podmnožinou druhé. Tranzitivita relace $\approx$ odpovídá tranzitivitě biresidua (Věta 2.22).

4.4 Reprezentace klasickými množinami

S klasickými množinami umíme zacházet, a tak se vyplatí umět fuzzy množiny převádět na klasické a zpět, beze ztráty informace. Ukážeme dva takové převody: první je založen na tzv. řezech, druhý na podmnožinách součinu $X \times L$.

Reprezentace pomocí řezů

L -množiny v X mohou být reprezentovány systémy podmnožin množiny X .

Definice 4.5

Nechť A je L -množina v X , $a \in L$. Pak a -řez L -množiny A je podmnožina ${}^aA$ množiny X definovaná

$${}^aA = \{x \in X \mid A(x) \geq a\}.$$

Slovy: ${}^aA$ je množina prvků, jejichž stupeň příslušnosti do A je větší nebo roven a .


Příklad 4.12

- (1) Nechť $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $L = \{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1\}$, a uvažujme L -množinu A v X (s libovolnou strukturou L):

$$A = \{^0/x_1, ^1/x_2, ^{\frac{2}{3}}/x_3, ^{\frac{2}{3}}/x_4\}$$

$$\text{Pak } {}^0A = X, {}^{\frac{1}{3}}A = {}^{\frac{2}{3}}A = \{x_2, x_3, x_4\}, {}^1A = \{x_2\}.$$

(2) Uvažujme trojúhelníkovou množinu danou takto:



Pro $a = 0.7$ máme ${}^aA = [5.7, 6.3]$.

Definice 4.6

L -indexovaný systém $S = \{A_a \subseteq X \mid a \in L\}$ se nazývá **L-vnořený**, pokud

- (1) $a \leq b$ implikuje $A_b \subseteq A_a$,
- (2) pro každé $x \in X$ má množina $\{a \mid x \in A_a\}$ největší prvek.

Dva L -indexované systémy $\{A_a \mid a \in L\}$ a $\{B_a \mid a \in L\}$ jsou si rovny právě tehdy, když $A_a = B_a$ pro všechna $a \in L$. Ve **L-vnořeném** systému $\{A_a \subseteq X \mid a \in L\}$ navíc musí platit $A_0 = X$.

Lemma 4.13

Pro L -množinu A v X je $\{{}^aA \mid a \in L\}$ **L-vnořený** systém.

Důkaz

Nechť $a \leq b$. Pokud $x \in {}^bA$, pak $b \leq A(x)$, a tedy i $a \leq A(x)$. A proto $x \in {}^aA$. Největší prvek $\{a \mid x \in {}^aA\}$ je zjevně $A(x)$.

Pro L -množinu A v X a systém $\mathcal{S} = \{A_a \subseteq X \mid a \in L\}$ podmnožin množiny X definujeme systém $\mathcal{S}_A \subseteq 2^X$ a L -množinu $A_{\mathcal{S}} \in L^X$ předpis

$$\mathcal{S}_A = \{{}^aA \mid a \in L\}, \quad A_{\mathcal{S}}(x) = \bigvee_{x \in A_a} a.$$

Věta 4.14

Nechť $A \in L^X$ a $\mathcal{S}$ je **L-vnořený systém**. Pak

- (1) $\mathcal{S}_A$ je **L-vnořený systém**,
- (2) $A = A_{\mathcal{S}_A}$,
- (3) $\mathcal{S} = \mathcal{S}_{A_{\mathcal{S}}}$.

Důkaz

Tvrzení (1) víme z předchozího lemmatu.

(2): Nerovnost $A \leq A_{\mathcal{S}_A}$ vyplývá z $x \in {}^{A(x)}A \in \mathcal{S}_A$ dle definice $A_{\mathcal{S}_A}$. Nerovnost $A \geq A_{\mathcal{S}_A}$ platí, právě když $\bigvee_{x \in {}^a A} a \leq A(x)$, tj. právě když pro všechna $x \in {}^a A$ platí $a \leq A(x)$ – a to platí, protože $x \in {}^a A$ znamená $a \leq A(x)$.

(3): Musíme ověřit, že pro každé $a \in L$ platí $A_a = {}^a A_{\mathcal{S}}$. Pokud $x \in A_a$, pak $A_{\mathcal{S}}(x) = \bigvee_{x \in A_b} b \geq a$, a tedy $x \in {}^a A_{\mathcal{S}}$. Naopak pokud $x \in {}^a A_{\mathcal{S}}$, pak $a \leq \bigvee_{x \in A_b} b$. Dle definice **L-vnořeného systému** má množina $\{b \in L \mid x \in A_b\}$ největší prvek, nazvěme ho b^* ; takže $\bigvee_{x \in A_b} b = b^*$, a tedy $a \leq b^*$. A protože $\mathcal{S}$ je **L-vnořený systém**, máme $A_{b^*} \subseteq A_a$, a z $x \in A_{b^*}$ dostaneme $x \in A_a$.

Body (2) a (3) věty 4.14 říkají, že $A \mapsto \mathcal{S}_A$ a $\mathcal{S} \mapsto A_{\mathcal{S}}$ jsou vzájemně inverzní zobrazení mezi L^X a množinou všech **L-vnořených systémů** podmnožin množiny X . **L-množiny** jsou tedy **L-vnořenými systémy** plně reprezentovatelné.

Reprezentace pomocí podmnožin $X \times L$

Definice 4.7

Podmnožina $A \subseteq X \times L$ se nazývá (**L-množinově**) **reprezentativní**, pokud

- (1) pro každé $x \in X$, $\langle x, a \rangle \in A$ a $b \leq a$ implikují $\langle x, b \rangle \in A$.
- (2) pro každé $x \in X$ má množina $\{a \in L \mid \langle x, a \rangle \in A\}$ největší prvek.


Pro L-množinu $A \in L^X$ a podmnožinu $A' \subseteq X \times L$ položíme

$$\lfloor A \rfloor = \{ \langle x, a \rangle \in X \times L \mid a \leq A(x) \}$$

$$\lceil A' \rceil = \{ \langle x, a \rangle \in X \times L \mid a = \bigvee_{\langle x, b \rangle \in A'} b \}.$$

Příklad 4.15

Tento obrázek znázorňuje operátor $\lfloor \cdot \rfloor$.



Věta 4.16

Nechť $A \in L^X$ je L-množina a $A' \subseteq X \times L$ je reprezentativní množina. Pak

- (1) $\lfloor A \rfloor \subseteq X \times L$ je reprezentativní množina;
- (2) $\lceil A' \rceil$ je L-množina;
- (3) $A = \lceil \lfloor A \rfloor \rceil$ a $A' = \lfloor \lceil A' \rceil \rfloor$.

Důkaz

- (1) Pokud $\langle x, a \rangle \in \lfloor A \rfloor$ a $b \leq a$, pak $b \leq a \leq A(x)$, a tedy $\langle x, b \rangle \in \lfloor A \rfloor$ dle definice. Zjevně je $A(x)$ největší stupeň pravdivosti a takový, že $\langle x, a \rangle \in \lfloor A \rfloor$.
- (2) Plyne přímo z definice $\lceil A' \rceil$.
- (3) Protože $A(x)$ je největší a takové, že $\langle x, A(x) \rangle \in \lfloor A \rfloor$, dostáváme

$$A(x) = \bigvee_{\langle x, a \rangle \in \lfloor A \rfloor} a = \lceil \lfloor A \rfloor \rceil(x).$$

Pokud $\langle x, a \rangle \in A'$, pak $\lceil A' \rceil(x) \geq a$, a tedy $\langle x, a \rangle \in \lfloor \lceil A' \rceil \rfloor$.

Naopak necht' $\langle x, a \rangle \in \lfloor \lceil A' \rceil \rfloor$. Pak $a \leq \lceil A' \rceil(x)$, tj. $a \leq \bigvee_{\langle x, b \rangle \in A'} b$.

Protože A' je reprezentativní, $\{b \mid \langle x, b \rangle \in A'\}$ má největší prvek, řekněme b^* .

Takže $a \leq b^*$ a $\langle x, b^* \rangle \in A'$.

Protože A' je reprezentativní, dostaneme $\langle x, a \rangle \in A'$.

4.5 Binární L-relace a jejich skládání

Binární L-relace, tj. L-množiny v $X \times Y$, jsou fuzzy protějškem klasických binárních relací. Zavedeme pro ně dvě základní konstrukce – inverzní relaci a skládání. Obojí budeme potřebovat v kapitole o přibližném usuzování.

Definice 4.8

Inverzní relace binární L-relace $R \in L^{X \times Y}$ je L-relace $R^{-1} \in L^{Y \times X}$ definovaná pro $x \in X$ a $y \in Y$ předpisem

$$R^{-1}(y, x) = R(x, y).$$

Lemma 4.17

Pro $R, R_1, R_2, R_i \in L^{X \times Y}$ ($i \in I$) platí:

$$R = (R^{-1})^{-1}$$

$$\left(\bigcap_{i \in I} R_i\right)^{-1} = \bigcap_{i \in I} R_i^{-1} \quad \left(\bigcup_{i \in I} R_i\right)^{-1} = \bigcup_{i \in I} R_i^{-1}$$

$$(R_1 \otimes R_2)^{-1} = R_1^{-1} \otimes R_2^{-1} \quad (R_1 \rightarrow R_2)^{-1} = R_1^{-1} \rightarrow R_2^{-1}$$

$$S(R_1, R_2) = S(R_1^{-1}, R_2^{-1}) \quad (R_1 \approx R_2) = (R_1^{-1} \approx R_2^{-1})$$

Důkaz

Snadné cvičení – vše plyne přímo z definice inverzní relace.

Definice 4.9: skládání L-relací

Pro L-relace $R \in L^{X \times Y}$ a $S \in L^{Y \times Z}$ definujeme L-relace $R \circ S$, $R \triangleleft S$, $R \triangleright S$ a $R \square S$ v $X \times Z$ předpisy

$$(R \circ S)(x, z) = \bigvee_{y \in Y} (R(x, y) \otimes S(y, z)),$$

$$(R \triangleleft S)(x, z) = \bigwedge_{y \in Y} (R(x, y) \rightarrow S(y, z)),$$

$$(R \triangleright S)(x, z) = \bigwedge_{y \in Y} (S(y, z) \rightarrow R(x, y)),$$

$$(R \square S)(x, z) = \bigwedge_{y \in Y} (R(x, y) \leftrightarrow S(y, z)).$$

Poznámka

Složení $\circ$ je přímočaré zobecnění klasického skládání binárních relací: pro $R \subseteq X \times Y$ a $S \subseteq Y \times Z$ máme

$\langle x, z \rangle \in R \circ S$ právě když existuje $y \in Y$: $\langle x, y \rangle \in R$ a $\langle y, z \rangle \in S$

a pro $L = 2$ dává definice $\circ$ přesně toto. Skládání $\circ$ je navíc asociativní:

$$R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T.$$

Příklad 4.18

Nechť X je množina pacientů, Y množina symptomů nemocí a Z množina nemocí. L-relace $R \in L^{X \times Y}$ zachycuje, kdo má jaké symptomy (výsledky lékařské prohlídky), a L-relace $S \in L^{Y \times Z}$ zachycuje, které symptomy souvisejí s kterou nemocí (lékařská znalost).

Chceme zjistit, kteří pacienti mají které nemoci – tedy získat L-relaci mezi X a Z . Každé ze čtyř složení na to odpovídá jinak:

- $(R \circ S)(x, z)$ je pravdivostní stupeň, ve kterém existuje symptom y takový, že pacient x má symptom y a y je symptom nemoci z .
- $(R \triangleleft S)(x, z)$ je pravdivostní stupeň, ve kterém je pravda, že pokud pacient x má symptom y , pak y je symptomem nemoci z .
- $(R \triangleright S)(x, z)$ je pravdivostní stupeň, ve kterém je pravda, že pacient x má všechny symptomy nemoci z .

- $(R \sqcap S)(x, z)$ je pravdivostní stupeň, ve kterém je pravda, že pacient x má právě symptomy nemoci z .

Složení $\circ$ tedy odpovídá obratu „existuje y takové, že ...“, složení $\triangleleft$ a $\triangleright$ obratům tvaru „pro každé y platí ...“. Které skládání zvolit, závisí na tom, jaký vztah mezi x a z chceme vyjádřit.

Věta 4.19: skládání a inverzní relace

Pro $*$ $\in \{\circ, \triangleleft, \triangleright, \sqcap\}$ platí

$$(R * S)^{-1} = S^{-1} * R^{-1}.$$

Poznámka

Zjevně platí $R \sqcap S = (R \triangleleft S) \cap (R \triangleright S)$ a dle předchozí věty také $R \triangleright S = (S^{-1} \triangleleft R^{-1})^{-1}$. Za základní skládání L-relací tedy můžeme považovat jen dvojici $\circ$ a $\triangleleft$ (nebo dvojici $\circ$ a $\triangleright$).

Věta 4.20: skládání a podmnožinovitost

$$\begin{aligned} S(R_1, R_2) \otimes S(S_1, S_2) &\leq S(R_1 \circ S_1, R_2 \circ S_2), \\ S(R_2, R_1) \otimes S(S_1, S_2) &\leq S(R_1 \triangleleft S_1, R_2 \triangleleft S_2), \\ S(R_1, R_2) \otimes S(S_2, S_1) &\leq S(R_1 \triangleright S_1, R_2 \triangleright S_2). \end{aligned}$$

Důkaz: první nerovnost

Tato nerovnost je ekvivalentní

$$(R_1 \circ S_1)(x, z) \otimes S(R_1, R_2) \otimes S(S_1, S_2) \leq (R_2 \circ S_2)(x, z).$$

A máme

$$\begin{aligned}
& (R_1 \circ S_1)(x, z) \otimes S(R_1, R_2) \otimes S(S_1, S_2) \\
&= (\bigvee_{y \in Y} R_1(x, y) \otimes S_1(y, z)) \otimes S(R_1, R_2) \otimes S(S_1, S_2) \\
&= \bigvee_{y \in Y} (R_1(x, y) \otimes S_1(y, z) \otimes S(R_1, R_2) \otimes S(S_1, S_2)) \\
&\leq \bigvee_{y \in Y} (R_1(x, y) \otimes (R_1(x, y) \rightarrow R_2(x, y)) \\
&\quad \otimes S_1(y, z) \otimes (S_1(y, z) \rightarrow S_2(y, z))) \\
&\leq \bigvee_{y \in Y} R_2(x, y) \otimes S_2(y, z) = (R_2 \circ S_2)(x, z).
\end{aligned}$$

Zbýlé dvě nerovnosti se dokáží podobně (cvičení).

Věta 4.21: skládání a distributivita

$$\begin{aligned}
(\bigcup_i R_i) \circ S &= \bigcup_i (R_i \circ S) & R \circ (\bigcup_i S_i) &= \bigcup_i (R \circ S_i) \\
(\bigcup_i R_i) \triangleleft S &= \bigcap_i (R_i \triangleleft S) & R \triangleleft (\bigcap_i S_i) &= \bigcap_i (R \triangleleft S_i) \\
(\bigcap_i R_i) \triangleright S &= \bigcap_i (R_i \triangleright S) & R \triangleright (\bigcup_i S_i) &= \bigcap_i (R \triangleright S_i)
\end{aligned}$$

Věta 4.22: skládání a distributivita II

$$\begin{aligned}
(\bigcap_i R_i) \circ S &\subseteq \bigcap_i (R_i \circ S) & R \circ (\bigcap_i S_i) &\subseteq \bigcap_i (R \circ S_i) \\
(\bigcap_i R_i) \triangleleft S &\supseteq \bigcup_i (R_i \triangleleft S) & R \triangleleft (\bigcup_i S_i) &\supseteq \bigcup_i (R \triangleleft S_i) \\
(\bigcup_i R_i) \triangleright S &\supseteq \bigcup_i (R_i \triangleright S) & R \triangleright (\bigcap_i S_i) &\supseteq \bigcup_i (R \triangleright S_i)
\end{aligned}$$

Důkazy obou vět o distributivitě jsou snadným cvičením na vlastnosti $\otimes$ a $\rightarrow$ vzhledem k infimům a supremům (Věty 2.14 a 2.15).

4.6 L-ekvivalence

Na závěr kapitoly zavedeme L-ekvivalence, tj. binární L-relace, které modelují podobnost a nerozlišitelnost. Podrobněji se jim budeme věnovat v kapitole 7.

Definice 4.10

Binární L-relace E na X se nazývá **L-ekvivalence**, pokud pro libovolná $x, y, z \in X$ platí

$$E(x, x) = 1 \quad (\text{reflexivita})$$

$$E(x, y) = E(y, x) \quad (\text{symetrie})$$

$$E(x, y) \otimes E(y, z) \leq E(x, z) \quad (\text{tranzitivita})$$

L-ekvivalence se nazývá **L-rovnost**, pokud

$$E(x, y) = 1 \text{ implikuje } x = y.$$

Pro L-ekvivalenci se také používají jiné termíny; nejčastější jsou **podobnost**, **fuzzy podobnost** a **nerozlišitelnost**.

Poznámka

Vlastnosti (reflexivita), (symetrie) a (tranzitivita) z předchozí definice jsou přímá zobecnění týchž vlastností z bivalentního případu. Uvažujme totiž $\mathbf{L} = \mathbf{2}$. Pro reflexivitu a symetrii je to zjevné. U tranzitivity: jsou-li $\langle x, y \rangle$ a $\langle y, z \rangle$ v E , tj. $E(x, y) = 1$ a $E(y, z) = 1$, pak $1 = 1 \otimes 1 = E(x, y) \otimes E(y, z) \leq E(x, z)$, tedy $E(x, z) = 1$, tj. $\langle x, z \rangle$ je v E ; relace E je tedy tranzitivní v bivalentním smyslu. Naopak nechť je E tranzitivní v bivalentním smyslu. Buď je $E(x, y) = 0$ nebo $E(y, z) = 0$, a pak (tranzitivita) platí triviálně; nebo je $E(x, y) = 1$ a $E(y, z) = 1$, tedy $\langle x, y \rangle$ a $\langle y, z \rangle$ jsou v E , z tranzitivity je $\langle x, z \rangle$ v E , tj. $E(x, z) = 1$, a (tranzitivita) platí také.

Jednu L-ekvivalenci už známe: relace $\approx$ na množině L^X je reflexivní, symetrická i tranzitivní, jak jsme dokázali výše, a protože $A \approx B = 1$ implikuje $A = B$, je to L-rovnost. Podobně je bi-residuum $\leftrightarrow$ L-rovností na množině L .

Příklad 4.23

Nechť $X = \{x, y, z, u\}$, $\mathbf{L}$ je standardní Łukasiewiczova algebra na $[0, 1]$ a binární L-relace E je dána tabulkou

E	x	y	z	u
x	1	0.9	0.8	1
y	0.9	1	0.7	0.9
z	0.8	0.7	1	0.8
u	1	0.9	0.8	1

Snadno ověříme, že relace E je $\mathbf{L}$ -ekvivalence, avšak nikoli $\mathbf{L}$ -rovnost. Pokud bychom však uvažovali její restrikcí na množinu $\{x, y, z\}$, získali bychom $\mathbf{L}$ -rovnost. Naproti tomu kdyby $\mathbf{L}$ byla Gödelova algebra, E by již nebyla $\mathbf{L}$ -ekvivalence, protože

$$0.8 = E(y, x) \otimes E(x, z) = \min(0.9, 0.8) \not\leq E(y, z) = 0.7,$$

a tedy E není tranzitivní.

Cvičení

1. Necht' $X = \{x_1, x_2, x_3\}$, $A = \{^{0.8}/x_1, ^{0.5}/x_2, ^0/x_3\}$ a $B = \{^{0.6}/x_1, ^{0.9}/x_2, ^{0.3}/x_3\}$. Spočítejte $A \cap B$, $A \cup B$, $A \otimes B$, $A \rightarrow B$ a $\neg A$ v Łukasiewiczově i Gödelově struktuře.
2. Pro množiny z předchozího cvičení spočítejte $S(A, B)$, $S(B, A)$ a $A \approx B$ v obou strukturách.
3. Pro trojúhelníkovou $\mathbf{L}$ -množinu A z Příkladu 4.12 určete řezu $^{0.3}A$, $^{0.5}A$ a ^1A a ověřte na nich rekonstrukci $A(x) = \bigvee_{x \in a} a$.
4. Dokažte lemma o vlastnostech inverzní relace (v textu ponecháno jako cvičení).
5. Dokažte asociativitu skládání: $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$. (Návod: Věta 2.14.)
6. Dokažte zbylé dvě nerovnosti věty o skládání a podmnožinovitosti (pro $\triangleleft$ a $\triangleright$).
7. Ověřte přepočtem všech potřebných trojic, že relace E z posledního příkladu je tranzitivní vůči Łukasiewiczově t -normě.